

Estimados padre, madre o tutor:

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el virus del papiloma humano (VPH) causa más de 26.000 casos nuevos de cáncer en hombres y mujeres estadounidenses cada año, entre ellos cáncer de útero y de boca (oral). Muchos de estos cánceres se pueden prevenir mediante una vacuna segura y efectiva que se puede aplicar a niños y niñas a partir de los 9 años de edad. El Código 20-34-4-3 de Indiana requiere que el Departamento de Salud del Estado de Indiana le informe acerca del VPH, su relación con el cáncer y la vacuna disponible.

El CDC ha manifestado que, según estudios recientes, el VPH es tan común que casi todas las personas sexualmente activas lo van a contraer durante su vida.¹ Por eso es tan importante vacunar a los niños antes de que puedan exponerse al virus. Según el CDC, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y el Colegio Estadounidense de Médicos, todos los niños y niñas de entre 11 y 12 años de edad deberían vacunarse.² Si bien los adolescentes de mayor edad y los adultos jóvenes pueden vacunarse hasta los 26 años, los estudios han demostrado que la vacuna produce una mejor respuesta inmunológica a edades más tempranas.

La vacuna contra el VPH ofrece una protección duradera contra nueve tipos de VPH y ha demostrado ser efectiva en la prevención de numerosos tipos de cánceres, entre ellos el cáncer de útero y orofaríngeo. También protege contra las verrugas genitales. La vacuna se puede aplicar junto con otras vacunas recomendadas y se administra en una serie de dos o tres dosis, dependiendo de la edad del/ de la paciente al comenzar con la serie. Es importante completar la serie.

Estas vacunas se han estudiado minuciosamente por cuestiones de seguridad. Según el CDC, se han administrado casi 100 millones de dosis en los Estados Unidos y los datos siguen demostrando que la vacuna contra el VPH es segura y efectiva. Como ocurre con cualquier vacuna, los preadolescentes y los adolescentes deben sentarse o recostarse por aproximadamente 15 minutos después de recibir la vacuna contra el VPH como prevención en caso de desmayos.

Si bien la inmunización contra el VPH no es obligatoria en Indiana, es una de las pocas herramientas disponibles para prevenir el cáncer. Le recomendamos que consulte al prestador de atención médica de su hijo/a sobre la vacuna. En caso de tener alguna pregunta, puede dirigirse al Programa de Vacunaciones del Departamento de Salud del estado de Indiana al (800) 701-0704.

Para obtener más información acerca del VPH y la vacuna, visite:

Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):

<https://www.cdc.gov/std/spanish/vph/default.htm>

Sitio web sobre la vacuna contra el VPH del CDC: <http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hpv/> (solamente en inglés)

Sitio web de la Coalición para la Acción en Inmunización (IAC): <http://www.vaccineinformation.org/hpv/>

¡Buena salud!

División de Inmunizaciones del Departamento de Salud del Estado de Indiana

¹ <http://www.cdc.gov/hpv/whatishpv.html>

² <https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine.html>

